



Profilaktyka raka szyjki macicy

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu



Rak szyjki macicy w Polsce

Szósty co do częstości nowotwór u kobiet

Na raka szyjki macicy zapada około 3000 kobiet rocznie

Umieralność na raka szyjki macicy jest o 70% wyższa od średniej w Unii Europejskiej

Zbyt późna wykrywalność (45–50% rozpoznań dotyczy choroby w III–IV stadium zaawansowania)



Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy

zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV


wiek (ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem)

wczesne rozpoczęcie życia seksualnego

duża liczba partnerów seksualnych

palenie tytoniu

wcześniejsze zmiany w badaniu cytologicznym





Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Jest adresowany do kobiet
w wieku 25 - 59 lat

Badanie cytologiczne

- co 36 miesięcy
- co 12 miesięcy dla kobiet obciążonych czynnikami ryzyka

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę

Badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym zakontraktowanym przez NFZ

Nie jest wymagane skierowanie



Etapy realizacji programu

Etap podstawowy

- Cytologia – pobranie materiału do przesiewowego badania

Etap diagnostyczny

- Ocena mikroskopowa materiału cytologicznego w pracowni patomorfologii

Etap pogłębionej diagnostyki

- Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, specjalista kieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę (badanie kolposkopowe)

Dalsze procedury

- Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, zostają skierowane na dalszą diagnostykę lub leczenie



Jak przygotować się do badania cytologicznego

Wstrzemięźliwość seksualna min. dobę przed badaniem

Przed badaniem nie przyjmować leków dopochwowych

Może być wykonana min. 2 - 3 dni po zakończeniu miesiączki

Nie wykonuje się badania podczas infekcji dróg rodnych



Cytologia w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu

W Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu rozmazy cytologiczne oceniane są przez doświadczoną kadrę specjalistów, w której skład wchodzi:

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Gabriel – patomorfolog
- lek. med. Andrzej Rychlewski – patomorfolog
- mgr Elżbieta Pinocy – Karkoszka – diagnosta laboratoryjny